

**INFORME-SE SOBRE O USO RESPONSÁVEL
DE MEDICAMENTOS.**

**O VERDADEIRO TRATAMENTO COMEÇA
COM INFORMAÇÃO!**



Alerta!

Orientação referente ao uso racional de medicamentos.

100 MG

USO ADULTO

**O USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS
CAUSA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.**

**A COMERCIALIZAÇÃO, A PRESCRIÇÃO E O FORNECIMENTO, AINDA QUE
GRATUITO, DE MEDICAMENTOS SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO
COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, CONSTITUI CRIME.**

M USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS

**VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA**



**A VENDA E O USO DESTES MEDICAMENTOS
DEVE OCORRER APENAS COM PRESCRIÇÃO
MÉDICA.**

Material desenvolvido pelo Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas - NEPSD em parceria
com a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas - ABEAD.

www.politicassobredrogas.pr.gov.br
www.abead.com.br



VENVANSE

Usado para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH

Efeitos colaterais

- Aumento da pressão arterial, aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio
- Falsa sensação de energia, otimismo e psicoagitações comportamentais

“A anfetamina leva a uma intoxicação mais duradoura do que a própria cocaína. Quando são usadas essas substâncias, o humor torna-se elevado, mas pode ser seguido de uma apatia, sonolência, aumento do apetite, compulsão alimentar, depressão ou abstinência.”

(Dr. Wanderley Cerqueira Lima, neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein)

OZEMPIC

Usado para o tratamento de diabetes tipo 2

Efeitos colaterais

- Vômito e refluxo
- Glicose baixa no sangue
- Cálculo de vesícula biliar
- Tontura
- Gastrite
- Desidratação

“O Ozempic, aprovado e comercializado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2, não possui indicação aprovada pelas agências regulatórias nacionais e internacionais para o tratamento de obesidade” (Laboratório Novo Nordisk, BBC).

**O USO INDISCRIMINADO DESSES MEDICAMENTOS,
PODE OCASIONAR CONSEQUÊNCIAS GRAVES.**

ALUCINAÇÕES INTOXICAÇÃO
TONTURA AGRESSIVIDADE
TOLERÂNCIA AO MEDICAMENTO
PARANÓIA REAÇÕES ALÉRGICAS
ANSIEDADE DESIDRATAÇÃO
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
AUMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL

Dificuldade de diagnóstico de condições de saúde mental
mais grave por mimetizar sintomas de vários transtornos.

RITALINA

Usado para o tratamento de TDAH

Efeitos colaterais

- Arritmia
- Sonolência
- Tontura
- Insônia
- Cefaleia
- Perda de apetite
- Nervosismo
- Hipertensão arterial

Este medicamento possui o mesmo mecanismo de ação da cocaína. Frequentemente, é usada de forma indiscriminada por estudantes e empresários que pretendem manter um alto nível de concentração ao longo de várias horas

ZOLPIDEM

Usado para tratamento de insônia

Efeitos colaterais

- Alucinações
- Pesadelos
- Agressividade
- Sonambulismo
- Tontura
- Amnésia para fatos recentes

ADDERALL

Usado para o tratamento de TDAH

Efeitos colaterais

- Aumento da pressão cardíaca e arterial
- Paranoia
- Picos de raiva
- Insônia e Ansiedade

A venda deste medicamento não é regulamentada pela ANVISA no Brasil.